| EDAD | VACUNAS | DOSIS | ABREVIATURA |
|--|--------------------------------------|--|-------------|
| JÓVENES Y ADULTOS (DE 18 A 64 AÑOS) | Hepatitis B | Iniciar o completar esquema | НВ |
| | Triple Viral | Iniciar o completar esquema (A) | SPR/MMR/TV |
| | Doble bacteriana | Refuerzo cada 10 años | dT |
| | Fiebre Hemorrágica Argentina | Única dosis (B) (a partir de los 15 años) | FHA |
| | Neumococo Conjugada 13 valente | Esquema secuencial (C) | PCV13 |
| | Neumococo Polisacárida 23 valente | Esquema secuencial (C) | PPV23 |
| | Antigripal (Influenza) | Dosis Anual (D) | - |
| PERSONA GESTANTE Y PUERPERIO | Antigripal (Influenza) | Una dosis (E) | - |
| | Hepatitis B | Iniciar o completar esquema | НВ |
| | Triple Bacteriana Acelular | Una dosis (F) | dTpa |
| ADULTOS MAYORES DE 65 AÑOS | Neumococo Conjugada 13 valente | Esquema secuencial | PCV13 |
| | Neumococo Polisacárida 23 valente | Esquema secuencial | PPV23 |
| | Antigripal (Influenza) | Dosis Anual | - |
| | Doble bacteriana | Refuerzo cada 10 años | dT |
| | Hepatitis B | Iniciar o completar esquema | НВ |

- (A) Si no hubiera recibido dos dosis de triple viral o una dosis de triple viral + 1 dosis de doble viral, después del año de vida para los nacidos después de 1965.
- (B) Residentes y/o trabajadores con riesgo ocupacional en zonas de riesgo y que no hayan recibido previamente la vacuna.
- (C) Se recomienda la vacunación secuencial con PCV13+PPV23 para adultos entre 18 y 65 años con factores de riesgo, según lineamientos del Ministerio de Salud, disponible en: https://www.argentina.gob.ar/salud/vacunas/neumococo.
- (D) Recomendada a personas con factores de riesgo según lineamientos del Ministerio de Salud, disponible en: https://bancos.salud.gob.ar/recurso/guia-rapida-de-vacunacion-antigripal-2022
- (E) En cada embarazo deberán recibir la vacuna antigripal en cualquier trimestre de la gestación. Puérperas deberán recibir vacuna antigripal si no la hubiesen recibido durante el embarazo, antes del egreso de la maternidad y hasta un máximo de 10 días después del parto.
- (F) Aplicar en cada embarazo independientemente del tiempo transcurrido desde la dosis previa. Aplicar a partir de las 20 semanas de gestación.